

VRAGEN

Als u vragen of problemen heeft, kunt u deze aan de verpleegkundige of de arts voorleggen. U kan ook altijd bellen.

U kan het longartsenteam als volgt bereiken:

Secretariaat longziekten Vitaz:

Van maandag tot en met vrijdag,
van 08.30 uur tot 17.30 uur
03 760 23 27

Secretariaat privéconsultatie

August de Boeckstraat 1,
9100 Sint-Niklaas
03 369 22 44

DIENT LONGZIEKTEN

03 760 23 27



INFORMATIEFOLDER

HISTAMINE PROVOCATIE TEST

VITAZ vzw

Moerlandstraat 1 | 9100 Sint-Niklaas
T. +32 (0)3 760 60 60
info@vitaz.be | www.vitaz.be
BE 0881.291.322 | RPR Gent
Art. 20110 | v1 | 26/05/2025

WAT?

Dit is een onderzoek om een verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen vast te stellen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van histamine, een prikkelende, maar onschadelijke stof, waarmee de gevoeligheid van de luchtwegen gemeten kan worden. Deze stof kan een luchtwegvernauwing veroorzaken.

WAAR MOET U ZIJN?

U dient zich op de afgesproken datum en tijdstip aan te melden in de privéconsultatie van de longartsen:

August de Boeckstraat 1 bus 4 (eerste verdieping)
9100 Sint-Niklaas

VOORBEREIDING

- U hoeft niet nuchter te zijn.
- Het totale onderzoek kan één uur in beslag nemen.
- Let op uw voeding: de dag van het onderzoek drinkt u vooraf géén koffie, thee, cola of energiedranken.

Het is belangrijk dat u rustig en ontspannen aan het onderzoek begint. Voor het goed slagen van de test dient u te stoppen met het innemen van bepaalde medicijnen.

TE STOPPEN MEDICATIE	MINIMUM STOPTIJD VOOR HET ONDERZOEK
Ventolin®	6 uur
Atrovent®, Combivent®, Duovent®	12 uur
Symbicort®, Seretide®, Inuvair®	36 uur
Oxis®, Serevent®, Foradil®	36 uur
Relvar®	48 uur
Spiriva®, Incruse®, Seebri®, Bretaris®, Anoro®, Ultibro®, Trimbow®, Trelegy®	≥ 1 week
Antihistaminica	72 uur
Andere:	... uur

Verwittig uw arts als u kort voor het onderzoek een verkoudheid of bronchitis heeft doorgemaakt. Het onderzoek zal dan meestal uitgesteld moeten worden.

HET ONDERZOEK

Tijdens het onderzoek zit u op een stoel. U krijgt een klem op de neus om te voorkomen dat u door uw neus ademt. U ademt via een mondstuk dat is verbonden met een meetapparaat.

Bij het begin van de test vraagt de verpleegkundige u om een paar keer diep in te ademen en zo krachtig mogelijk uit te ademen. Daarna moet u verschillende levels met histamine inhaleren.

Na iedere inhalatie wordt de longfunctie gemeten. Aan de hand van de meetresultaten kan worden vastgesteld of astmatische klachten (hoesten en benauwdheid) kunnen worden opgewekt.

De test wordt beëindigd als er een bepaalde eindconcentratie van de histaminenevel is bereikt of als er een bepaalde reactie in de luchtwegen is opgewekt. Als er een reactie van de luchtwegen optreedt dan wordt deze met luchtwegverwijdende medicijnen behandeld.

Het onderzoek wordt beëindigd als de longfunctie weer normaal is geworden. U kunt een lichte vorm van benauwdheid tijdens het onderzoek ervaren, die verdwijnt zodra u de luchtwegverwijder heeft ingeademd.

NA HET ONDERZOEK

- U kunt tijdelijk lichte keelpijn hebben of een prikkelhoest. Dit verdwijnt spontaan.
- Het onderzoek is belastend vanwege het vele blazen, maar is verder niet gevaarlijk.