

WANNEER MOET U EEN ARTS RAADPLEGEN:

- Als u plots **ademhalingsproblemen** krijgt.
- Als u **pijn** ondervindt **in de borstkas**.
- Wanneer u **veel bloed ophoest**.
- Als u plots **hoge koorts** ontwikkelt ($> 38,5^{\circ}\text{C}$).

VERVOER

U krijgt voor het onderzoek een verdovend medicijn waarvan u ook na het onderzoek nog wat hinder kan ondervinden. U mag daarom na afloop van het onderzoek beslist geen wagen of andere voertuigen besturen. U dient het ziekenhuis steeds onder begeleiding van een derde persoon te verlaten. Bij onderzoek onder algemene anesthesie, mag u de eerste nacht volgend op het onderzoek niet alleen thuis blijven.

HET RESULTAAT

Mogelijk werd er tijdens het onderzoek een stukje weefsel weggenomen dat verder onderzocht moet worden in het labo. Het duurt enkele werkdagen voor het resultaat bekend is. U krijgt de resultaten tijdens de volgende consultatie bij uw longarts.


VRAGEN

Als u vragen of problemen heeft, kunt u deze aan de verpleegkundige of de arts voorleggen. U kan het longartsenteam ook telefonisch bereiken:

Secretariaat longziekten Vitaz | 03 760 23 27

Van maandag tot en met vrijdag,
van 08.30 uur tot 17.30 uur

Buiten de openingsuren van het secretariaat longziekten kunt u via het nummer 03 760 60 60 contact opnemen met de telefooncentrale van het ziekenhuis. Zij kunnen u in contact brengen met de dienstdoende longarts. Indien nodig kunt u ook rechtstreeks naar de spoedgevallendienst gaan.



DIENT LONGZIEKTEN

03 760 23 27

INFORMATIEFOLDER

BRONCHOSCOPIE

VITAZ vzw

Moerlandstraat 1 | 9100 Sint-Niklaas
T. +32 (0)3 760 60 60
info@vitaz.be | www.vitaz.be
BE 0881.291.322 | RPR Gent
Art. 20112 | v1 | 23/06/2025

U kwam onlangs met symptomen of voor een controle bij de longarts. Om meer over de oorzaak van uw symptomen te weten te komen, is er een afspraak gemaakt voor een bronchoscopie.

Bij een bronchoscopie kijkt de longarts in de luchtwegen met behulp van een bronchoscoop. Dit kijk-instrument bestaat uit een dunne flexibele slang met een lens of een videocamera. Het doel is om het slijmvlies te bekijken en zo nodig weefselstukjes te nemen voor verder onderzoek.

WAAR MOET U ZIJN?

U meldt zich op de afgesproken datum en uur aan de inschrijvingskiosken in de inkomhal van campus Sint-Niklaas - Moerlandstraat. Van daar wordt u naar het dagziekenhuis doorverwezen.

VOORBEREIDING

- Voor het onderzoek moet u nuchter zijn. Noodzakelijke medicatie mag u innemen met een slokje water.
- Onderzoek in de **voormiddag**: U mag de avond voor het onderzoek vanaf middernacht niets meer eten of drinken.
- Onderzoek in de **namiddag**: U mag voor 07.00 uur een licht ontbijt nemen. Na 07.00 uur mag u niets meer eten of drinken.
- U mag 24 uur voor het onderzoek absoluut niet meer **roken**.
- Verwittig uw arts en/of verpleegkundige als u **zwanger** bent.
- Verwijder, indien van toepassing, voor het onderzoek uw gebitsprothese en/of bril.
- Bij aankomst in het dagziekenhuis zal u gevraagd worden om het document voor **geïnformeerde toestemming** te handtekenen.
- **Medicatie**:
 - Verwittig uw arts als u **allergisch** bent voor bepaalde geneesmiddelen en meer specifiek als het gaat om lokale of algemene verdovingsmiddelen.

- **Ingeademde medicijnen zoals inhalatoren** kan u zonder meer blijven gebruiken, zelfs op de dag van het onderzoek, tenzij anders aangegeven door uw longarts.
- **Bloedverduunners**: Tenzij anders aangegeven door uw longarts geldt:
 - Pradaxa®, Lixiana®, Eliquis®, Xarelto® (NOAC's) worden 48 uur voor de ingreep gestopt. U mag m.a.w. de dag voorafgaand aan het onderzoek en de dag van het onderzoek zelf deze medicatie niet innemen.
 - Plavix® (clopidogrel), Ticlid® (ticlopidine), Efient® (prasugrel) en Brilique® (ticagrelor) dienen minstens 7 dagen voorafgaand aan het onderzoek onderbroken te worden.
 - Asaflow® dient 5 dagen voor het onderzoek gestopt te worden.
 - Bloedverdunnende spuitjes (Fraxiparine®, Innohep®, Clexane® en Fraxodi®) mogen niet toegediend worden 48 uur voor het onderzoek. U mag m.a.w. de dag voorafgaand aan het onderzoek en de dag van het onderzoek zelf deze medicatie niet toegediend krijgen.
 - Voor het onderbreken van vitamine K antagonist (Marcoumar®, Marevan®, Sintrom®) dient een overbrugging met bloedverdunnende spuitjes gegeven te worden en een voorafgaandelijke stollingscontrole te gebeuren. Hiervoor volgt u de specifieke aanbevelingen van uw longarts.
- **Diabetes**:
 - Biguaniden (Metformine®, Metformax®, Janumet®, Eucreas®, Jentaduo®, Vipdomet®, Synjardy®, Vokanamet®, Xigduo®): deze medicatie mag niet ingenomen worden op de dag van de ingreep.
 - SGLT2 inhibitoren (Canifligozine (Invokana®), Dapaglifozine (Forxiga®), Empaglifozine (Jardiance®), Ertuglifozine (Steglatro®)) moeten 48 uur voorafgaand gestopt worden. U mag m.a.w. de dag voorafgaand aan het onderzoek en de dag van het onderzoek zelf deze medicatie niet innemen.

VERLOOP VAN HET ONDERZOEK

Duurtijd: 5 tot 60 minuten, afhankelijk van de complexiteit van de procedure en het type sedatie.

- De arts verdooft uw keel, mond en neusholte enkele malen met een verdovingspray. Het slikken gaat moeilijker, maar is nog steeds mogelijk.
- Het onderzoek gebeurt onder lokale verdoving en wordt gecombineerd met een lichte sedatie of 'roes'. Op specifieke indicatie kan het onderzoek ook onder algemene anesthesie uitgevoerd worden.
- Een soepele slang (bronchoscoop) wordt voorzichtig in de keel gebracht. Een bijtring beschermt uw tanden en het toestel. De arts schuift dan de endoscoop tot in de luchtpijp. Tijdens het onderzoek kan het nodig zijn om een klein stukje weefsel (biopsie) weg te nemen voor onderzoek in het laboratorium.
- Wanneer de arts klaar is, wordt de slang voorzichtig uit uw mond gehaald.

NA HET ONDERZOEK

- Na het onderzoek blijft u nog even ter observatie in het dagziekenhuis. De duur van observatie is afhankelijk van het verloop van het onderzoek.
- U mag tot 2 uur na het onderzoek niet eten of drinken. Wees voorzichtig wanneer u het eten en/of drinken herneemt. Probeer daarom eerst met een slokje water.
- Uw keel kan na het onderzoek wat rauw aanvoelen. Soms kunt u enkele spatjes bloed ophoesten. Dit is niet verontrustend.
- U kunt 's avonds een beetje koorts ervaren. In dat geval mag u een paracetamol nemen.