

Infusie

Februari 2026

Locoregionale anesthesie

Epidurale analgesie, spinale/rachianesthesie en
combined spinal-epidural

Vlaanderen

- In **76,5%** van alle bevallingen wordt gebruik gemaakt van locoregionale anesthesie, waarbij het aandeel **76,2%** bedraagt bij eenlingen en **94,5%** bij meerlingen.
- Bekijken we enkel de vaginale bevallingen, dan wordt bij **69,9%** locoregionale anesthesie toegepast.
- Bij keizersneden gebeurt de ingreep in **93,7%** onder locoregionale anesthesie, terwijl **6,1%** onder algemene anesthesie plaatsvindt.
- Over de periode 2015–2024 stijgt het gebruik van locoregionale anesthesie van **69,8%** naar **76,5%**.

Hoewel men bij een fysiologische benadering van arbeid en bevalling streeft naar een zo laag mogelijk gebruik van anesthesie spelen verschillende factoren hierin een rol. Onder meer de aanwezigheid en beschikbaarheid van een anesthesist kan het cijfer beïnvloeden, al verwachten we anno 2026 dat dit minder bepalend zou moeten zijn.

Vitaz

- Ook in Vitaz zien we een stijging in dezelfde periode: van **63,1%** naar **67,9%**.
- Hiermee blijven we onder het Vlaams gemiddelde.

Rangschikking:

- ➔ In 4 materniteiten ligt het gebruik lager
- ➔ In 52 materniteiten hoger dan in Vitaz

Vitaz staat hiermee op plaats 5.

